

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)	อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกประเภท	
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)	Mortality Rate	
นิยามคำอธิบายความหมายของตัวชี้วัด	1. ผู้ป่วยเสียชีวิต หมายถึงผู้ป่วยในที่เสียชีวิต ณ โรงพยาบาล 2. ผู้ป่วยในหมายถึงผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล(admit)	
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด	- เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบ่งชี้หาสาเหตุและปัจจัยความผิดปกติอันส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน - ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยในในภาพรวม	
สูตรในการคำนวณ	$(a/b) \times 100$	
ข้อมูลที่ ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนผู้ป่วยในที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด
	ตัวหาร	b = จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน
รหัสโรค/ หัตถการ ที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	-
	ตัวหาร	-
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล	ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)	
หน่วยวัด	ร้อยละ	
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล	< 4 %	
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ปี)*	สำนักบริหารการสาธารณสุข (สปรส.) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
วิธีการแปลผล	ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี	
ที่มา/ Reference	สำนักบริหารการสาธารณสุข (สปรส.) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
วันเดือนปีที่เริ่มใช้	1 กุมภาพันธ์ 2560	
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด		
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบรายงาน นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์คำ / 0873136586	