

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)	อัตราการตายของมารดา	
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)	Maternal Mortality Ratio	
นิยามคำอธิบายความหมายของตัวชี้วัด	การตายของมารดาหมายถึง การตายในหน่วยงานห้องคลอดของหญิงขณะตั้งครรภ์ หรือภายใน 42 วันหลังสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้อง	
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด	ลดอัตราการตายของมารดาและเพิ่มการดูแลหญิงตั้งครรภ์และการคลอดให้มีประสิทธิภาพ	
สูตรในการคำนวณ	$(a/b) \times 100,000$	
ข้อมูลที่ ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนมารดาตายในแต่ละเดือน
	ตัวหาร	b = จำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมดในเดือนนั้นๆ
รหัสโรค/ หัตถการ ที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	
	ตัวหาร	
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล	ทุกเดือน	
หน่วยวัด	ไม่เกิน 15:100,000 ทารกเกิดมีชีพ(อัตรา)	
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล		
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *	กรมอนามัย ปี 2557 = 31.2 : 100,000 ทารกเกิดมีชีพ	
วิธีการแปลผล	ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี	
ที่มา/ Reference	กรมอนามัย	
วันเดือนปีที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2557	
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด	1 ธันวาคม 2559	
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ	นนทิยา สมบัติพูนผล / 055022000 ต่อ 3801-3802 ผู้รับผิดชอบ	