

Template

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)		อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Upper GI hemorrhage ภายใน 28 วัน
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)		UGIH: Total re-admission rate into the hospital within 28 days of UGIH patients
นิยามคำอธิบายความหมายของตัวชี้วัด		1. ผู้ป่วย UGIH หมายถึง ผู้ป่วยใน(ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในรพ. (admit \geq 4 ชั่วโมง) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคที่มีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10TM, ICD-9 ดังที่ระบุไว้ 2. การรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรค UGIH ภายใน 28 วัน ทั้งหมดหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปโรงพยาบาลอื่นหรือไม่ยินยอมรับการรักษาดตามแผน
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด		ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค Upper GI hemorrhage ที่เป็นผู้ป่วยใน ในภาพรวม
สูตรในการคำนวณ		$(a/b) \times 100$
ข้อมูลที่ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนผู้ป่วย Upper GI hemorrhage ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล
	ตัวหาร	b = จำนวนผู้ป่วย Upper GI hemorrhage ที่จำหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/ หัตถการที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	Pdx=K25.0,K25.1,K25.2,K25.4,K25.5,K25.6,K26.0,K26.1,K26.2,K26.4,K26.5,K26.6,K27.0,K27.1,K27.2,K27.4,K27.5,K27.6,K28.0,K28.1,K28.2,K28.4,K28.5,K28.6,K29.0,K92.0,K92.1,K92.2
	ตัวหาร	Pdx=K25.0,K25.1,K25.2,K25.4,K25.5,K25.6,K26.0,K26.1,K26.2,K26.4,K26.5,K26.6,K27.0,K27.1,K27.2,K27.4,K27.5,K27.6,K28.0,K28.1,K28.2,K28.4,K28.5,K28.6,K29.0,K92.0,K92.1,K92.2
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล		ทุกเดือน
หน่วยวัด		ร้อยละ
เป้าหมาย		ไม่เกินร้อยละ 10
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *		
วิธีการแปลผล		ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
ที่มา/ Reference		THIP I
วันเดือนปีที่เริ่มใช้		1 ตุลาคม 2557
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด		
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ		ผู้รับผิดชอบรายงาน / Tel