

Template : ภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัดทอนซิล

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)		ภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัดทอนซิล
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)		Rate of Post – tonsillectomy hemorrhage within 28 days after Tonsillectomy
นิยามคำอธิบายความหมายของตัวชี้วัด		ภาวะเลือดออกจากแผลผ่าตัดภายหลังการผ่าตัดทอนซิล ภายใน 28 วัน หลังจากวันผ่าตัด
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด		ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดทอนซิล
สูตรในการคำนวณ		$(a/b) \times 100$
ข้อมูลที่ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทอนซิลที่มีเลือดออกจากแผลผ่าตัดภายใน 28 วัน หลังจากวันผ่าตัด
	ตัวหาร	b = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทอนซิลทั้งหมดในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	pdx = -
	ตัวหาร	pdx = -
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล		ทุก 3 เดือน
หน่วยวัด		ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล		
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ปี) *		
วิธีการแปลผล		ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
ที่มา/ Reference		THIP I ,สปสช.
วันเดือนปีที่เริ่มใช้		1 ตุลาคม 2555
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด		
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ		ผู้รับผิดชอบรายงาน / Tel