

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)	อัตราการเกิดแผลกตามกระดูกหักภายหลังจากผ่าตัด 6 เดือน	
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)	Fail plate Fracture of femur : Rate of failed plating in femoral fracture during 6 months post-operative period	
นิยามคำอธิบายความหมายของตัวชี้วัด	<p>1.ผู้ป่วย fracture of femur ที่รักษาโดยการผ่าตัดตามเหล็กกระดูกต้นขากระดูกต้นขาหักโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10-TM 79.35 ดังที่ระบุไว้</p> <p>2.ผู้ป่วย Fracture of femur ที่รักษาโดยการผ่าตัดตามเหล็กกระดูกต้นขา กลับเข้ารพ. ด้วยปัญหาเหล็กหักซ้ำภายหลังจากผ่าตัดตามเหล็ก 6 เดือนโดยมีรหัสโรคตาม ICD-10-TM T 84.2 ดังที่ระบุไว้</p> <p>3.ผู้ป่วยต้องมีการรับรู้ดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ภาวะการบาดเจ็บทางการสมอง, การหักของกระดูกตำแหน่งอื่นๆ</p>	
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด	ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค Fracture of femur ที่เป็นผู้ป่วยใน ในภาพรวม	
สูตรในการคำนวณ	$(a/b) \times 100$	
ข้อมูลที่ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนผู้ป่วย Fracture of femur ที่ กลับเข้ารพ. ด้วยปัญหาเหล็กหักซ้ำภายหลังจากผ่าตัดตามเหล็ก 6 เดือน
	ตัวหาร	b = จำนวนผู้ป่วย Fracture of femur ที่รักษาโดยการผ่าตัดตามเหล็กกระดูกต้นขาจำนวน ในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	pdx = T 84.2
	ตัวหาร	pdx = 79.35
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล	ทุกเดือน	
หน่วยวัด	ร้อยละ	
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล		
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *		
วิธีการแปลผล	ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี	
ที่มา/ Reference	THIP I ,สปสช.	
วันเดือนปีที่เริ่มใช้	1 ตุลาคมคค 2559	
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด		
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบรายงาน / Tel	