

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)		อัตราการเกิดข้อสะโพกหลุดซ้ำในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ภายใน 3 เดือนหลังผ่าตัด
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)		Hip dislocation after hip arthroplasty : Hip dislocation rate after hip arthroplasty during 3 months post-operative period
นิยามคำอธิบายความหมาย ของตัวชี้วัด		1.ผู้ป่วย ข้อสะโพกหักหมายถึงผู้ป่วยในที่มีPrincipal Diagnosis (pdx) เป็นโรคกระดูกข้อสะโพกหักหรือเสื่อมมีรหัสโรคตาม ICD-10-TM M 360-M 169 S 72.0ดังที่ระบุไว้และได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมมีรหัสโรคตาม ICD-10-TM 81.51 81.52 81.53 2.ผู้ป่วยในหมายถึงการรับกลับเข้ารพ. ของผู้ป่วย ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยปัญหาข้อสะโพกหลุดภายหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 3 เดือน มีรหัสโรคตาม ICD-10-TM T84.0
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด		ประเมินประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ที่เป็นผู้ป่วยใน ในภาพรวม
สูตรในการคำนวณ		$(a/b) \times 100$
ข้อมูลที่ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ที่ต้องรับกลับเข้าโรงพยาบาลด้วยปัญหาข้อสะโพกหลุดภายหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 3 เดือน
	ตัวหาร	b = จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ที่จำหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	pdx = T84.0
	ตัวหาร	pdx = 81.51 81.52 81.53
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล		ทุกเดือน
หน่วยวัด		ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล		
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *		
วิธีการแปลผล		ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
ที่มา/ Reference		THIP I ,สปสช.
วันเดือนปีที่เริ่มใช้		1 ตุลาคมคค 2559
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด		
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ		ผู้รับผิดชอบรายงาน / Tel