

หมวดตัวชี้วัด	Neurovascular disease	
ประเภทตัวชี้วัด	Stroke	
รหัสตัวชี้วัด		
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาไทย)	อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล	
ชื่อตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)	Stroke : Time to thrombolytic administration	
นิยาม คำอธิบาย ความหมายของ ตัวชี้วัด	<p>1. ผู้ป่วย ischemic stroke หมายถึง ผู้ป่วยที่มี principaldiagnosis (pdx) เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรืออุดตัน โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ ระบุไว้</p> <p>2. ผู้ป่วย ischemic stroke ที่ได้รับ thrombolytic agent ภายใน 60 นาทีเมื่อแรกรับ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามของการให้ยา และได้รับ thrombolytic agent ในการรักษา ภายใน 60 นาที นับตั้งแต่ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาที่ ER/ OPD และรับไว้ใน โรงพยาบาล จนถึงระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยา (door to needle time)</p>	
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด	ประเมินประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ischemic stroke ที่ได้รับ thrombolytic agents	
สูตรในการคำนวณ	$(a/b) \times 100$	
ข้อมูลที่ ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนผู้ป่วย ischemic stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ภายใน 60 นาที หลังมาถึง รพ. แต่ละครั้ง
	ตัวหาร	b = จำนวนผู้ป่วย ischemic stroke ที่ได้รับ Thrombolytic Agents ที่รับเข้ารักษาใน รพ. ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น
รหัสโรค/ หัตถการ ที่ เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	pdx = I63, I64, I65, I66, I67 และ procedure 99.10 ภายใน 60 นาที
	ตัวหาร	pdx = I63, I64, I65, I66, I67 และ procedure 99.10 ทั้งหมด
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล	ทุกเดือน หรือ เดือนละครั้ง (ตัวชี้วัดรายเดือน)	
หน่วยวัด	ร้อยละ	
เป้าหมาย	> 80 %	
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี)*		
วิธีการแปลผล	ค่ายิ่งมาก = มีคุณภาพดี	
ที่มา/ Reference	THIP I , ศูนย์ข้อมูลระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์	
วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2557	
วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงครั้ง ล่าสุด		
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ		