

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)	จำนวนครั้งการแพ้ยาซ้ำในระบบโรงพยาบาล	
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)	Number of patients with in hospital re-ADR	
นิยามคำอธิบายความหมายของตัวชี้วัด	การแพ้ยาซ้ำ หมายถึง เหตุการณ์ที่ผู้ป่วยได้รับการบริหารยาทั้งโดยตนเอง ผู้ดูแลหรือจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วเกิดอาการแพ้ยา โดยที่ผู้ป่วยเคยเกิดอาการแพ้ยาดังกล่าวจากยาที่มีชื่อสามัญทางยาเดียวกัน และยาสูตรโครงสร้างทางเคมีเดียวกันมาก่อนทั้งที่เคยมีประวัติและไม่มีประวัติการบันทึกในเวชระเบียน หรือเอกสารของโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ยกเว้นการตั้งใจให้ยาซ้ำของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ในการรักษาหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรือกรณีผู้ป่วย ตั้งใจใช้ยาซ้ำด้วยตนเอง	
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด	เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้ำของโรงพยาบาล	
สูตรในการคำนวณ	-	
ข้อมูลที่ ต้องการ	ตัวตั้ง	จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่แพ้ยาซ้ำ
	ตัวหาร	-
รหัสโรค/ หัตถการ ที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	-
	ตัวหาร	-
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล	ทุกเดือน	
หน่วยวัด	จำนวนครั้ง	
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล	มากกว่า หรือเท่ากับ 1 ครั้งขึ้นไป	
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *	โรงพยาบาลในเขต 3	
วิธีการแปลผล	ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี	
ที่มา/ Reference	สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล	
วันเดือนปีที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2557	
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด	17 กุมภาพันธ์ 2560	
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ	ภญ.พรสุรางค์ จำชาติ / Tel 4106, 4108, 4115	