

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)	อัตราความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาผู้ป่วยใน	
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)	Administration error : in-patient	
นิยามคำอธิบายความหมายของตัวชี้วัด	ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนการบริหารยาแก่ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล โดยเป็นผลให้ไม่เป็นไปตามหลักการให้ยาในด้าน ถูกคน ถูกยา ถูกขนาด ถูกเวลา ถูกวิถีทาง ถูกเทคนิค และไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการรักษา รวมถึงการที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการให้ยาตามที่แพทย์สั่ง	
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด	เพื่อทราบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการบริหารยาให้ผู้ป่วยใน และใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ นำไปสู่การวิเคราะห์สาเหตุ และวิธีแก้ไขเพื่อสร้างระบบความปลอดภัยด้านยาแก่ผู้ป่วย	
สูตรในการคำนวณ	- (a/b) x1000	
ข้อมูลที่ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนรายการยาที่บริหารให้ผู้ป่วยในคลาดเคลื่อนใน 1 เดือน
	ตัวหาร	b = จำนวนวันนอนทั้งหมดใน 1 เดือน
รหัสโรค/หัตถการที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	-
	ตัวหาร	-
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล	ทุกเดือน	
หน่วยวัด	ครั้ง ต่อ 1000 วันนอน	
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล	มากกว่า 4 ต่อพันวันนอน	
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *		
วิธีการแปลผล	ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี	
ที่มา/ Reference	สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล	
วันเดือนปีที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2557	
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด	17 กุมภาพันธ์ 2560	
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ	ภญ. พรสุรางค์ จำชาติ / Tel 4106, 4108, 4115	