

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)	ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นแล้วและมีอันตรายต่อผู้ป่วย	
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)	Medication error level 5 (E). – Level 9 (I)	
นิยามคำอธิบายความหมายของตัวชี้วัด	เหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหรือนำไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย ในขณะที่ยานั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ผู้ป่วย หรือผู้บริโภคร เหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ ผลิตรภัณฑ์ กระบวนการ และระบบ อันได้แก่ การสั่งใช้ การสื่อสารคำสั่ง การเขียนฉลาก/บรรจุ/ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ การผสม การจ่าย การกระจาย การให้ยา (หรือการบริหารยา) การให้ข้อมูล การติดตาม และการใช้”	
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด	เพื่อทราบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการใช้ผู้ป่วย และใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ นำไปสู่การวิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไข เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยด้านยาแก่ผู้ป่วย	
สูตรในการคำนวณ	-	
ข้อมูลที่ ต้องการ	ตัวตั้ง	-
	ตัวหาร	-
รหัสโรค/ หัตถการ ที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง	-
	ตัวหาร	-
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล	ทุกเดือน	
หน่วยวัด	จำนวนครั้ง	
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล	มากกว่า หรือเท่ากับ 1 ครั้งขึ้นไป	
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ ปี) *	โรงพยาบาลในเขต 3	
วิธีการแปลผล	ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี	
ที่มา/ Reference	สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล	
วันเดือนปีที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2557	
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด	17 กุมภาพันธ์ 2560	
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ	ภญ.พรสุรางค์ จำชาติ / Tel 4106, 4108, 4115	