

ตัวชี้วัด (ภาษาไทย)		การแพ้สารที่บ่งชี้แบบรุนแรง
ตัวชี้วัด (ภาษาอังกฤษ)		
นิยามคำอธิบายความหมายของตัวชี้วัด		<p>1. จำนวนผู้ป่วยที่แพ้สารที่บ่งชี้แบบรุนแรงในการตรวจพิเศษ หมายถึง จำนวนผู้ป่วยที่ทำการฉีดสารที่บ่งชี้แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผื่นแดงทั่วทั้งใบหน้าและลำตัว หนาวสั่น ปวดหลัง อาเจียน - หัวใจเต้นเร็ว ชีต เหงื่อออกมือ เท้าเย็น ความดันโลหิตต่ำ - หายใจเร็ว หายใจช้า หายใจเสียงดัง เสียงหวีด - ชัก <p>2. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วยสารที่บ่งชี้ทั้งหมด หมายถึง จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดสารที่บ่งชี้เข้าทางหลอดเลือดดำทั้งหมด ในแต่ละเดือน</p>
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด		ประเมินประสิทธิภาพการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการแพ้สารที่บ่งชี้
สูตรในการคำนวณ		$(a/b) \times 100$
ข้อมูลที่ต้องการ	ตัวตั้ง	a = จำนวนผู้ป่วยที่แพ้สารที่บ่งชี้แบบรุนแรงในแต่ละเดือน
	ตัวหาร	b = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วยสารที่บ่งชี้ทั้งหมดในแต่ละเดือน
ความถี่ในการจัดทำข้อมูล		ทุกเดือน
หน่วยวัด		ร้อยละ
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมูล		
Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ปี) *		
วิธีการแปลผล		ค่ายิ่งน้อย = มีคุณภาพดี
ที่มา/ Reference		ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ / ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย
วันเดือนปีที่เริ่มใช้		
วันเดือนปีที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด		
เหตุผลของการปรับปรุง		
หมายเหตุ		นางอัจฉรา โพธิ์มาก และ นายบดินทร์ ปทุมทอง / 055-713772 (2203)